

# Proseminář teoretické fyziky

prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.

RNDr. Otakar Svítek, Ph.D.

NTMF029 LS: 0/2 Z – jaro 2022

## Zápočtový problém č. 2

Řešení úkolu bude hodnoceno buď jako *správné* nebo jako *neúplné*. Neúplná řešení budou vrácena k dopracování.

Termín odevzdání 2. zápočtového problému je 19. května 2022..

Řešení v elektronické formě (pdf, scan či foto) nahrajte v SISu v modulu studijní mezivýsledky.

Uvažujme komplexní pole  $\psi$ , tj. skalární pole nabývající hodnoty v komplexních číslech. Toto pole bude možné interpretovat jako nabité pole náboje  $+e$ . S tímto polem máme přirozeně asociované komplexně sdružené pole  $\bar{\psi}$  náboje  $-e$ , které též nazýváme antipolem.

Ač jsou pole  $\psi$  a antipole  $\bar{\psi}$  navzájem komplexně sdružená, lze je často chápat jako relativně nezávislá skalární pole. Důvodem je, že pole  $\psi$  ve skutečnosti obsahuje dvě nezávislé reálné komponenty – svojí reálnou a imaginární část. Uvažování polí  $\psi$  a  $\bar{\psi}$  nezávisle umožňuje vlastně přístup k oběma reálným složkám.

Na těchto polích můžeme definovat tzv. kalibrační kovariantní derivaci zahrnující interakci nabitých polí s elektromagnetickým polem popsaným vektorovým 4-potenciálem  $A_\mu$ . Na pole náboje  $+e$  působí derivace  $\mathcal{D}_\mu$  předpisem

$$\mathcal{D}\psi = \nabla\psi - ieA_\mu\psi$$

a na antipola s nábojem  $-e$  působí derivace  $\bar{\mathcal{D}}_\mu$  jako

$$\bar{\mathcal{D}}\bar{\psi} = \nabla\bar{\psi} + ieA_\mu\bar{\psi}.$$

Často se derivace  $\mathcal{D}$  a  $\bar{\mathcal{D}}$  shodně nazývají  $\mathcal{D}$  a implicitně se předpokládá, že v členu se 4-potenciálem je vždy použit správný náboj podle pole, na které derivace působí.

Dynamika nabitých polí  $\psi$  a  $\bar{\psi}$  a jejich interakce s elektromagnetickým polem je zachycena akcí

$$S_{NP}[\psi, \bar{\psi}, A_\mu] = - \int_{\Omega} \left[ \eta^{\mu\nu} \mathcal{D}_\mu \psi \bar{\mathcal{D}}_\nu \bar{\psi} + m^2 \psi \bar{\psi} \right] d^4\Omega.$$

Zde  $\eta_{\mu\nu}$  je Minkowského metrika a uvažujeme volbu jednotek  $c = 1$ .

- (i) Variací akce podle pole  $\psi$  a antipole  $\bar{\psi}$  nalezněte pohybové rovnici pro obě pole.

Při variování podle komplexního pole vyjádřete změnu akce  $\delta S$  jako lineární kombinaci malých změn  $\delta\psi$  a  $\delta\bar{\psi}$ ,

$$\delta S = \int_{\Omega} \left[ (\dots) \delta\psi + (\dots) \delta\bar{\psi} \right] d^4\Omega.$$

Koeficienty u  $\delta\psi$  a  $\delta\bar{\psi}$  pak považujte za variace  $\frac{\delta S}{\delta\psi}$  a  $\frac{\delta S}{\delta\bar{\psi}}$ .

Oddiskutujte, že obě výsledné pohybové rovnice jsou navzájem konzistentní.

(ii) Variací akce vektorového 4-potenciálu  $A_\mu$  nalezněte elektrický 4-tok nesený společně poli  $\psi$  a  $\bar{\psi}$ ,

$$J_{\text{NP}}^\mu = \frac{\delta S_{\text{NP}}}{\delta A_\mu} .$$

(iii) Ověřte, že akce je invariantní vůči kalibrační transformaci

$$\psi \rightarrow \tilde{\psi} = \exp(i e \alpha) \psi , \quad \bar{\psi} \rightarrow \bar{\tilde{\psi}} = \exp(-i e \alpha) \bar{\psi} , \quad A_\mu \rightarrow \tilde{A}_\mu = A_\mu + \nabla_\mu \alpha$$

(iv) Rozštěpením prostoročasu na čas a prostor nalezněte Lagrangián  $L_{\text{NP}}(\psi, \dot{\psi}, \bar{\psi}, \dot{\bar{\psi}}, \varphi, \vec{A})$ .

Zde je výhodné zavést prostorovou kovariantní derivaci  $\vec{\mathcal{D}}\psi$  a kovariantní časovou derivaci  $\mathcal{D}_0\psi$ ,

$$\begin{aligned} \vec{\mathcal{D}}\psi &= \vec{\nabla}\psi - ie \vec{A}\psi , & \mathcal{D}_0\psi &= \dot{\psi} + ie \varphi \psi , \\ \vec{\mathcal{D}}\bar{\psi} &= \vec{\nabla}\bar{\psi} + ie \vec{A}\bar{\psi} , & \mathcal{D}_0\bar{\psi} &= \dot{\bar{\psi}} - ie \varphi \bar{\psi} . \end{aligned}$$

Pole  $\varphi$  a  $\vec{A}$  jsou standardní skalárni a vektorový potenciál elektromagnetického pole.

(v) Určete nábojovou hustotu  $\rho_{\text{NP}}$  a tok náboje  $\vec{j}_{\text{NP}}$  asociované s nabitymi poli

$$\rho_{\text{NP}} = -\frac{\delta L_{\text{NP}}}{\delta \varphi} , \quad \vec{j}_{\text{NP}} = \frac{\delta L_{\text{NP}}}{\delta \vec{A}} .$$

(vi) Nalezněte hybnosti polí

$$\pi = \frac{\delta L_{\text{NP}}}{\delta \dot{\psi}} , \quad \bar{\pi} = \frac{\delta L_{\text{NP}}}{\delta \dot{\bar{\psi}}} .$$

(vii) Napište Hamiltonián

$$H_{\text{NP}}(\psi, \pi, \bar{\psi}, \bar{\pi}) = \int_{\Omega} [\dot{\psi}\pi + \dot{\bar{\psi}}\bar{\pi}] d^4\Omega - L_{\text{NP}}(\psi, \dot{\psi}, \bar{\psi}, \dot{\bar{\psi}}) .$$

nabitych polí.

### K rozmyšlení navíc (nepovinné):

Pokud budeme uvažovat, že elektromagnetické pole vystupující v akci pro nabité pole je také dynamické, s akcí  $S_{\text{EM}}$  uvedenou na přednášce, jaký bude příspěvek polí  $\psi$  a  $\bar{\psi}$  do Gaussovy vazby  $G$  vzniklé při budování hamiltonovského formalismu celého systému polí  $\psi$ ,  $\bar{\psi}$  a  $A_\mu$ ? Neboli, jaká bude Gaussova vazba v systému s akcí  $S = S_{\text{EM}}(A) + S_{\text{NB}}(\psi, \bar{\psi}, A)$ ? Gaussova vazba zde vznikne zcela stejným způsobem jak bylo diskutováno na přednášce, tj. jako sekundární vazba zajišťující konstantnost primární vazby  $\kappa = 0$ .

### Poznámky na okraj:

Uvedený příklad je nejjednodušší případ interakce tzv. *kalibračního pole* (zde elektromagnetické pole  $A$ ) s poli hmoty (pole  $\psi$  a  $\bar{\psi}$ ).

Kalibrační pole lze místo vektorového 4-potenciálu  $A$  popsat též přímo *kalibrační kovariantní derivací*  $\mathcal{D}$  na polním prostoru. Z matematického hlediska se jedná o derivaci na *fibrovaném prostoru*. Intenzita kalibračního pole  $F_{\mu\nu}$  má pak interpretaci *křivosti* této derivace.

Kalibrační teorie jsou vždy invariantní vůči grupě kalibračních transformací. V našem případě se jedná o transformace zachovávající skalárni součin  $\psi \bar{\psi}$ . Čili kalibrační transformace tvoří v každém prostoročasovém bodě grupu  $U(1)$ .

Standardní model – současná teorie elementárních částic – je vystaven právě na základě teorie kalibračních polí. Kalibrační i hmotová pole jsou v tomto případě již složitější než jednoduché elektromagnetické a skalárni pole. Nicméně např. s interakčními členy vstupujícími do akce skrze zobecněnou kovariantní derivaci  $\mathcal{D}$  se v obecné teorii budeme setkávat.