

Seznam vzorců pro zápočtovou písemku II.

Důležité komutátory

$$\begin{aligned}[x_\alpha, p_\beta] &= i\hbar\delta_{\alpha,\beta} \\ [J_\alpha, V_\beta] &= i\hbar\varepsilon_{\alpha,\beta,\gamma}V_\gamma\end{aligned}$$

Moment hybnosti a sférické harmoniky

$$\begin{aligned}J^2|jm\rangle &= \hbar^2j(j+1)|jm\rangle \\ J_z|jm\rangle &= \hbar m|jm\rangle \\ J_\pm &= J_x \pm iJ_y \\ J_\pm|jm\rangle &= \hbar\sqrt{(j \mp m)(j \pm m + 1)}|jm \pm 1\rangle\end{aligned}$$

Několik prvních sférických harmonik:

$$\begin{aligned}Y_{00} &= \frac{1}{\sqrt{4\pi}} & Y_{22} &= \sqrt{\frac{15}{32\pi}} \frac{(x+iy)^2}{r^2} \\ Y_{11} &= -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \frac{x+iy}{r} & Y_{21} &= -\sqrt{\frac{15}{8\pi}} \frac{(x+iy)z}{r^2} \\ Y_{10} &= \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{z}{r} & Y_{20} &= \sqrt{\frac{5}{16\pi}} \frac{3z^2-r^2}{r^2} \\ Y_{1-1} &= \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \frac{x-iy}{r} & Y_{2-1} &= \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \frac{(x-iy)z}{r^2} \\ & & Y_{2-2} &= \sqrt{\frac{15}{32\pi}} \frac{(x-iy)^2}{r^2}\end{aligned}$$

Harmonický oscilátor

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2}x^2 = \hbar\omega(a^+a + 1/2)$$

$$x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \quad p_0 = \frac{\hbar}{x_0} \quad a = \frac{x/x_0 + ip/p_0}{\sqrt{2}}$$

$$[a, a^+] = 1 \quad a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle \quad a^+|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$$

$$\langle x|n\rangle = \sqrt{\frac{1}{\sqrt{\pi}x_0n!2^n}} H_n(x/x_0) \exp(-(x/x_0)^2/2)$$

Hermitovy polynomy

$$\begin{aligned}H_0(x) &= 1 & H_2(x) &= 4x^2 - 2 \\ H_1(x) &= 2x & H_3(x) &= 8x^3 - 12x\end{aligned}$$

Coulombický potenciál

$$\begin{aligned}V(x) &= \gamma/r & R_{10}(r) &= 2\sqrt{\frac{1}{a^3}} \exp(-r/a) \\ E_n &= -\frac{m\gamma^2}{2\hbar^2n^2} & R_{20}(r) &= \sqrt{\frac{1}{2a^3}} (1 - r/2a) \exp(-r/2a) \\ a &= \frac{\hbar^2}{m|\gamma|} & R_{21}(r) &= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{6a^3}} r/a \exp(-r/2a)\end{aligned}$$

Wignerova-Eckartova věta

$$\langle \alpha j m | T_M^{(J)} | \alpha' j' m' \rangle = \langle J j' M m' | j m \rangle \frac{(\alpha j || T^{(J)} || \alpha' j')}{\sqrt{2j+1}}$$

Clebsch-Gordanovy koeficienty $\langle j_1 j_2 m_1 m_2 | j m \rangle$

$$\boxed{j_2 = 0} \quad \langle j 0 m 0 | j m \rangle = 1$$

$$\boxed{j_2 = 1/2} \quad \langle j_1 \frac{1}{2} m_1 \pm \frac{1}{2} | j m \rangle$$

	$m = m_1 + \frac{1}{2}$	$m = m_1 - \frac{1}{2}$
$j = j_1 - \frac{1}{2}$	$-\sqrt{\frac{j+1-m}{2j+2}}$	$\sqrt{\frac{j+1+m}{2j+2}}$
$j = j_1 + \frac{1}{2}$	$\sqrt{\frac{j+m}{2j}}$	$\sqrt{\frac{j-m}{2j}}$

$$\boxed{j_2 = 1} \quad \langle j_1 1 m_1 m_2 | j m \rangle$$

	$m = m_1 + 1$	$m = m_1$	$m = m_1 - 1$
$j = j_1 - 1$	$\sqrt{\frac{(j-m+2)(j-m+1)}{(2j+2)(2j+3)}}$	$-\sqrt{\frac{(j+m+1)(j-m+1)}{(j+1)(2j+3)}}$	$\sqrt{\frac{(j+m+2)(j+m+1)}{(2j+2)(2j+3)}}$
$j = j_1$	$-\sqrt{\frac{(j-m+1)(j+m)}{2j(j+1)}}$	$\sqrt{\frac{m}{j(j+1)}}$	$\sqrt{\frac{(j+m+1)(j-m)}{2j(j+1)}}$
$j = j_1 + 1$	$\sqrt{\frac{(j+m)(j+m-1)}{2j(2j-1)}}$	$\sqrt{\frac{(j+m)(j-m)}{j(2j-1)}}$	$\sqrt{\frac{(j-m)(j-m-1)}{2j(2j-1)}}$

Gauntova formule

$$\int Y_{lm}(\theta, \varphi)^* Y_{l_1 m_1}(\theta, \varphi) Y_{l_2 m_2}(\theta, \varphi) d\Omega = \sqrt{\frac{(2l_1+1)(2l_2+1)}{4\pi(2l+1)}} \langle l_1 l_2 0 0 | l 0 \rangle \langle l_1 l_2 m_1 m_2 | l m \rangle$$